



Tilapia Rendalli

alevinos del valle las vende

Familia : Cichlidae
Subfamilia: Cuadro de Pseudocrenilabrinae
Orden: Perciformes (perca-tiene gusto)
Clase: Actinopterygii (pescados rayo-aletados) Tamaño máximo: 45 cm
Peso publicado máximo: 2.5 KL
Edad divulgada máximo: 7 años
Ambiente: Agua dulce y salobre
Clima: tropical; 24 - 28°C
Importancia: industrias pesqueras.

Distribución: geográfico en África: Río de Senegal y de Níger, sistema de río de Congo, sistema de río de Zambezi, lago Tanganyika y Malagarazi. También sabido de Shaba, de Kasai superior, sistema de Lualaba, lago Malawi, natal, Okavango y Cunene (referencia).

Introducido a otros Países generalmente para el control de mala hierba o vegetación acuática frondosa o difícil de erradicar.

Morfología:

Cabeza y cuerpo mediados de a verde oliva oscuro dorsal, palideciendo sobre los flancos.

Cuerpo generalmente con las barras verticales solamente y las escalas con una crescent básica oscura.

Aleta dorsal verde oliva con un margen y un blanco rojos finos a los puntos oblicuos oscuros grises en los rayos suaves.

aleta caudal manchada en mitad dorsal y roja o amarilla en la mitad ventral

Biología: Prolifera silenciosamente, agua con suficiente vegetación acuática e insectos, vegeta a lo largo de litorales o de remansos del río, los terrenos de aluvión y los pantanos.

Tolerante a una amplia gama de la temperatura de entre los 8 a los 41°C y salinidad al 25 ppt, es principalmente diurna.

ALIMENTACION

Los jóvenes alimentan en el plancton.

Los adultos alimentan principalmente en plantas y también algas más altas, insectos como moscas pues saltan a atraparlas, pulgas de agua, renacuajos y crustáceos.

Es un consumidor de alimento excelente